

Quando chiamare il veterinario

Da tenere accanto alla cassa parto. I segnali d'allarme non richiedono l'acquisto di un corso o l'accesso all'area abbonati.

SUBITO • possibile emergenza

- Respiro assente, difficoltoso o a bocca aperta; colore blastro o pallore marcato.
- Collasso, convulsioni, flaccidità o mancata risposta.
- Cucciolo freddo e debole, incapace di poppare, o che peggiora rapidamente.
- Latte dalle narici con tosse o alterazione del respiro; sanguinamento importante o trauma.

PRESTO • non aspettare il controllo di domani

- Suzione meno efficace, poppata non osservata o accesso ripetutamente fallito alla mammella.
- Peso che cala o non progredisce, soprattutto insieme a cambiamenti di comportamento.
- Pianto persistente, isolamento o quiete diversa dal solito.
- Diarrea, addome gonfio o doloroso, ombelico arrossato o con secrezioni.
- Madre malata, mammella dolente o cure materne insufficienti; più cuccioli che cambiano insieme.

Se sei in dubbio, chiama. Non aspettare che compaiano tutti i segnali e non usare un valore di peso rassicurante per ignorare una difficoltà respiratoria.

Mentre organizzi l'assistenza

Riduci le manipolazioni, mantieni il cucciolo asciutto e protetto dalla dispersione di calore senza fonti roventi a contatto. Segui le istruzioni del veterinario per il trasporto. Non forzare latte, acqua o zuccheri in bocca a un cucciolo freddo, debole o che non deglutisce; non scuotere e non improvvisare farmaci, sondini o rianimazione. [5, 6, 8]

Referente _____ Telefono _____

Urgenze _____ Telefono _____

Dì subito: età, segnale principale, quando è iniziato, ultimo peso e ultima poppata osservata. Non ritardare la chiamata per raccogliere tutti i dati.

Fonti: Pereira et al. 2024, doi:10.3390/ani14233417; RECOVER 2025, doi:10.1111/vec.70013; Merck Veterinary Manual, Management of the Neonate (2025); Fuchs et al. 2024, PMC11096582. Sintesi educativa, non algoritmo validato di triage. © Canine ReproVet 2026. Questa pagina può essere condivisa integralmente con attribuzione.